



# LES ÉLASTIQUES INTERMAXILLAIRES



**Les élastiques vont permettre d'emboîter les dents du haut avec les dents du bas. Si l'emboîtement ne se fait pas correctement, les dents seront amenées à rebouger une fois l'appareil retiré. Tu dois placer les élastiques selon le modèle donné par ton orthodontiste.**

---



## CONSIGNES

**Le non-respect des instructions peut produire des complications et retarder ou compromettre le résultat final.**

- Prends une photo et respecte le schéma qui a été donné.
- Retire les élastiques seulement lors des repas et du brossage.
- Remets un élastique neuf après chaque repas.
- Toujours avoir un paquet d'élastiques à ta portée pour pouvoir les changer en cas de casse.
- Le stock d'élastiques est à contrôler. Tu les trouveras uniquement chez ton orthodontiste.

**UNE JOURNÉE SANS ELASTIQUE = UNE SEMAINE DE PERDUE  
UNE SEMAINE SANS ELASTIQUE = UN MOIS DE PERDU**



## GESTION BLESSURES/CASSES

**Des douleurs et gênes sont normales durant les premiers jours.** Il est possible de les soulager avec du paracétamol.

**Si une attache est décollée ou si le fil est cassé,** ne porte plus les élastiques et il faut contacter le cabinet par téléphone afin d'évaluer le problème et de convenir d'un rendez-vous si nécessaire.



# LES ÉLASTIQUES INTERMAXILLAIRES

